



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Leendeförbättrande kirurgi, facialisnervrekonstruktion med fri gracilis

Information



Denna information har utformats för dig som ska genomgå leendeförbättrande operation med facialisnervrekonstruktion med fri gracilis. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Plastikkirurgmottagningen (vardagar 7 – 9.30) 018-611 54 36

Avdelning 85 F2 (akuta besvär, kvällar och helg) 018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Datum: 2020-06-30
ID: DocPlusSTYR196-2176


REGION UPPSALA

Nervfunktion vid ansiktsförlamning

Vid ansiktsförlamning kan det hända att nervfunktionen till viss del inte kommer tillbaka. Om nerven som styr leendet inte fungerar resulterar det i en hängande mungipa. Det kan vara svårt att äta, ansiktsuttryck kan vara asymmetriska och leendet snett.

Leendeförbättrande kirurgi

Genom att flytta en liten muskel från låret till kinden och koppla ihop den med nerven till tuggmuskeln, kan leendefunktionen förbättras.



Det är dock viktigt att veta att en operation aldrig kan ge samma resultat som före skadan, men det kan bli en klar förbättring. Att ta den lilla muskeln från låret ger ingen märkbar förändring då det finns flera muskler i området men det blir ett ärr i området där muskeln tas ifrån.

Operationen sker i narkos och tar 4–5 timmar.

Vårdtiden beräknas till 5 – 6 dagar, inklusive inskrivningsdagen.

Före operationen

- Om det är aktuellt i ditt fall så visar fysioterapeut dig en el-stimuleringsapparat som används efter operationen för att stimulera nervimpulserna. I så fall får du låna med dig apparaten hem.
- Du ska vara nikotinfri sex veckor före och sex veckor efter operation. Tobaksanvändning i samband med operation medför en ökad risk för komplikationer.

Efter operationen

- Du kommer vara rejält svullen i kinden efter operationen. Den svullnaden håller i sig flera veckor och kommer att minska gradvis.
- Ibland kan det behövas ytterligare en operation för att minska volymen på den flyttade muskeln i kinden.

Sjukskriven

Du blir sjukskriven 2 – 3 veckor efter operationen.

Sårläkning

En normal läkningsprocess innebär:

- Svag rodnad och klåda i sårkanterna
- Blåmärken som skiftar i färg
- Knölar runt ärret

Vid **ökad** rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår, bör du kontakta plastikkirurgmottagningen.

För finare ärrbildning

- Tejpa ärren med kirurgtejp i minst tre månader, finns att köpa på apotek
- Smörj ärren med mjukgörande salva
- Undvik att sola på ärren första året efter operation

Uppföljning

Återbesök till plastikkirurgmottagningen

- En vecka efter operation: sköterskebesök, tiden ges i samband med utskrivning. Besöket kan eventuellt ske på hemorten
- Tre månader efter operation: återbesök till läkare och fysioterapeut. Kontroll att den nya muskeln och nerven har börjat reagera
- Det kan ta upp till 6 eller 9 månader för muskeln att komma igång. Under denna tid blir du kallad för uppföljning. Du får råd om övningar som syftar till att träna upp den flyttade muskeln och kopplade nerven

Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.



1177 Vårdguiden

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se