




Tratamentul copiilor după asfixie, prin terapia de răcire

Informații pentru părinți



Aceste informații au fost concepute pentru părinții care au un copil care a suferit în timpul nașterii de asfixie, o combinație de hipoxie și scăderea aportului de sânge.

Nu știm întotdeauna motivul pentru care un copil suferă de asfixie, dar lipsa de oxigen și aportul redus de sânge pot afecta în diferite grade mai multe organe, inclusiv creierul. În această etapă incipientă, este dificil să știi dacă/cât de periculoasă a fost lipsa de oxigen pentru copilul tău, însă îți vom oferi ulterior toate informațiile pe care le avem, și atât asistentele, cât și medicii sunt disponibili pentru a-ți răspunde la întrebări.



Dacă ai întrebări contactează:

Contactează-ne prin serviciul electronic www.1177.se



Întoarce pagina
pentru a citi mai
multe!

Tratamentul copiilor după asfixie, prin terapia de răcire

Glosar

Hypoxie = lipsa de oxigen

Ischemie = scăderea fluxului sanguin

Asfixie = o combinație de hipoxie și scăderea fluxului sanguin

HIE = Encefalopatie ischemică hipoxică (efect cerebral după asfixie)

Hipotermie = Răcire = tratament de răcire

CFM = Monitorizarea funcției cerebrale

Ce putem face pentru a trata asfixia?

S-a demonstrat că răcirea, așa-numitul tratament cu hipotermie poate ajuta. La o temperatură mai scăzută a corpului, sunt mai lente atât metabolismul energetic cât și procesele de deteriorare, ceea ce reduce riscul de producere a unor leziuni grave datorită deficienței de oxigen.

Atât terapia de răcire cât și îngrijirea intensivă de care are nevoie copilul, implică utilizarea unui număr mare de echipamente tehnice, iar mediul din jurul copilului pare adesea nefiresc și uneori înspăimântător.

Voi părinții, aveți un loc evident lângă copilul vostru, există un pat pentru voi și sunteți de neînlocuit în îngrijirea copilului vostru.



Cum are loc terapia de răcire, aplicată copilului tău?

Terapia de răcire se efectuează prin îngrijirea copilului tău pe o saltea răcoritoare care menține temperatura corpului între 33,0–34,0 grade.

Tratamentul durează trei zile, după care copilul este încălzit din nou, în mod treptat, până se ajunge la temperatura normală a corpului.

Cum este monitorizat copilul tău în timpul terapiei de răcire?

Există întotdeauna personal lângă copil. În timpul terapiei de răcire, monitorizăm ritmul cardiac al copilului, respirația, tensiunea arterială și desigur temperatura corpului. Acestea se măsoară cu un termometru moale care este introdus puțin în esofag, prin nas.

Este monitorizată și activitatea creierului și acest lucru se numește CFM. Monitorizarea are loc prin plasarea electrozilor pe capul copilului și conectarea la un echipament special de monitorizare. Monitorizarea CFM are loc timp de o zi sau câteva zile.



Afectează terapia de răcire și asfixia și alte părți ale corpului copilului meu?

Terapia de răcire în sine, nu implică niciun risc, dar copilul tău poate fi palid și se poate simți rece la atingere. Pulsul și respirația sunt în mod normal mai lente când copilul este rece.

Este adesea dificil pentru copil să digere mâncarea, care în acest caz i se administrează în cantități mai mici.

Copilul poate fi liniștit și obosit și uneori corpul este încordat.

Copilul poate fi obosit și din cauza sedativelor administrate.

Uneori copilul nu poate respira singur și atunci este ajutat de un respirator, printr-o sondă de plastic fixată în trahee.

Ce putem face pentru a reduce disconfortul în timpul terapiei de răcire?

De obicei, copilul primește analgezice și sedative și este atent supravegheat pentru a se observa semnele de disconfort.

Copilul are nevoie de liniște și pace și încercăm să reducem cât mai mult stimulii externi, menținând niveluri scăzute de sunet și lumină.

Ce pot face eu pentru a-mi ajuta copilul în timpul terapiei de răcire?

Poți să fi mereu alături de copilul tău, poți să îl mângâi, să îl ții în brațe, să îi fii aproape, să îl hrănești și să îi schimbi scutecele.

Voi părinții, puteți face tot ceea ce ați fi făcut acasă, pentru copilul vostru bolnav.

Prezența voastră este importantă!

Cum primește copilul meu mâncare în timpul terapiei de răcire?

Copilul tău va fi hrănit intravenos dar și cu lapte matern.

Laptele matern poate fi administrat în cantități mici direct în gură și într-o sondă care trece prin nasul copilului până în stomac.

Laptele tău matern este valoros pentru copilul tău, îți dăm informații despre cum să începi și să menții producția de lapte matern.



1177

(Ghidul de îngrijire)

Vei găsi informații și servicii pentru sănătatea și îngrijirea ta pe site-ul 1177.se. Pentru sfaturi medicale sună la 1177, deschis 24 de ore pe zi.



Contact Akademiska

Spitalul Akademiska sjukhuset poate fi contactat la:

patientkontakt@akademiska.se

Contact pacienți 018-611 30 33,

Centrala: 018-611 00 00

www.akademiska.se

www.akademiska.se