AKADEMISKA SJUKHUSET

Information om ICD, implanterbar defibrillator

Det här är information till dig som ska få en implanterbar defibrillator, ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator).

Information om implanterbar defibrillator

Du kommer att få en implanterbar defibrillator ICD, inopererad. Efter operationen kommer din ICD bevaka din hjärtrytm och kan om det behövs omedelbart behandla en snabb och allvarlig rytmrubbning. Den fungerar även som en pacemaker vid behov. Operationen utförs på arytmilaboratoriet och görs i lokalbedövning. Operationen tar cirka 1-2 timmar. Operationen genomförs under röntgengenomlysning, varför gravida inte ska behandlas. Mer information angående risker med röntgen finns på 1177.se.

Inför din operation

Inför din operation kommer vi att kontrollera dina blodprover och ta EKG. Du kommer få muntlig information. Du ska duscha och tvätta håret med bakteriedödande tvål enligt skriftlig instruktion. Du ska fasta (du får inte äta eller dricka något) från kl 24, midnatt, på operationsdagen.

Om du tar läkemedel

Vid inskrivningen kommer din läkare gå igenom vilka av dina läkemedel som du får ta inför operationen.

- Waran behöver inte pausas.
- Övriga blodförtunnande läkemedel får du specifik information om vad som gäller just för dig.

På operationsdagen

Inför din operation får du en plastkanyl i armen, och eftersom du är fastande får du också ett vätskedropp. Eventuella mediciner får du ta med lite vatten.

Under operationen

Du skjutsas i din säng till arytmilaboratoriet, därefter flyttas du över till ett operationsbord.

- Du får antibiotika via dropp under ingreppet för att förebygga infektioner.
- Pacemakerdosan läggs oftast in under huden nedanför vänster nyckelben. I visas fall kan dosan placeras på höger sida.
- När fickan för pacemakerdosan görs kan du kortvarigt få ont.
- Elektroderna förs via blodkärl in till höger förmak eller höger kammare, och kopplas sedan till dosan. Du får 1-2 elektroder till hjärtat beroende på vilken funktion din ICD behöver.
- Din ICD kontrolleras innan du åker från arytmilaboratoriet.
- Ett förband läggs över såret.

Efter operationen

Det här händer efter din operation.

- Vi kontrollerar ditt blodtryck, puls, syremättnad och andningsfrekvens.
- Vi kommer att fråga dig hur du uppskattar din smärta.
- Du får äta, dricka och komma upp och gå direkt efter operationen.
- Vi inspekterar operationsområdet.
- I vissa fall behövs en röntgen av systemet efter ingreppet.
- Om ICD:n fungerar som den ska och du mår bra får du åka hem.
- Du får med dig ett informationsblad med rutiner från arytmilaboratoriet om hur du ska sköta såret efter operationen.
- Om du tycker att det känns ömt efter operationen kan du ta Alvedon.
- Du kommer erbjudas möjlighet till distansmonitorering av din dosa. Då kan vi få information från dosan skickad till sjukhuset.

Efter utskrivning

Du kommer att bli kallad på ett återbesök på hjärtmottagningen efter 6-8 veckor för kontroll av din ICD. Du kommer att få kontaktuppgifter till hjärtmottagningen när du skrivs ut så du kan kontakta dem vid frågor eller besvär efter operationen.

Det finns restriktioner innan du har varit på det första återbesöket. Restriktionerna gäller till exempel resor, armrörelser och tunga lyft. Du får information om detta i samband med operationen.

Du kommer att få ett kort hemskickat med posten som visar att du har en ICD och som du kan visa upp om du till exempel ska gå genom en kontroll på en flygplats.

Pacemakerregistret

Dosan och elektroderna som vi opererar in registreras i det svenska Pacemakerregistret. Om du behöver söka vård på ett annat sjukhus så kan de hitta information om din ICD i registret. Du kan säga till i samband med operationen om du inte vill vara med i Pacemakerregistret.

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta vår koordinator genom att ringa 018-611 43 96. Telefontiderna är måndag till torsdag klockan 13-14 eller via e-tjänster på 1177.se.