



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Läpp- och näsoperation

Information



Denna information har utformats för dig som ska genomgå läpp-, näsoperation vid läpp-, käk-, gomspalt.

Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

LKG-sjuksköterska (helgfri mån-fre)

Plastikkirurgmottagningen (helgfri mån-fre kl 7-9.30)

Vårdavdelning 85 F2 (akuta besvär, kvällar och helg)

018-611 93 74

018-611 54 36

018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Datum: 2024-01-29
ID: DocPlusSTYR196-1609

REGION UPPSALA

Övergripande om läpp- och näsoperation

Med detta menas att man sluter spalten i läppen, ibland justeras även näsan. Operationen innebär att man sluter i flera skikt: slemhinnan in mot munnen, läppmuskeln sys ihop och huden sys. Avtryck av spalten tas under narkos för att följa tillväxten av käken under uppväxten. Operationen sker i narkos och tar 1,5–2 timmar (enkelsidig läppspalt) samt 2–4 timmar (dubbelsidig läppspalt).

Inskrivning

På inskrivningsdagen får ni träffa:

- Inskrivningssjuksköterska
- Operatör
- Inskrivande läkare
- Narkosläkare

Vi kontrollerar vikt och syremättnaden i blodet.

Under kvällen ska ditt barn bada/duscha med vanlig tvål. Mjukgörande oljor eller krämer får ej användas efter dusch.

Operationsdagen

Nu ska ditt barn bada/duscha igen och ta på sig sjukhuskläder.

- Personal följer med ditt barn och dig till operationsavdelningen, narkospersonalen tar sedan hand om ditt barn vid sövningen. Därefter erbjuds du som anhörig frukost på vårdavdelningen
- Då barnet har vaknat, får en anhörig vara med på uppvakningsavdelningen, sedan hämtar personal från avdelningen er

Efter operationen

- Ni stannar kvar på vårdavdelningen en natt
- Ditt barn kan ha besvär från läppen, men oftast är det jobbigast med magknip på grund av narkosen. Under tiden är det viktigt att barnet får smärtlindring regelbundet. Smärtan behandlas med paracetamol. Se till att ha det hemma inför operationen.
- Ditt barn får dropp, så det är ingen brådska med att börja äta men så snart barnet önskar, går det bra att prova med dryck. Ditt barn får ammas eller äta med flaska som barnet är van vid
- Ditt barn får äta flytande mat fem dagar efter operationen, därefter mos/purémat i sju dagar
- Ditt barn får INTE ligga på mage eller suga på tröstnapp två veckor efter operationsdagen
- Stygnen på läppen försvinner av sig själva efter 1–2 veckor. Om stygn på huden finns kvar efter två veckor bör dessa tas bort. Tala gärna med LKG-sjuksköterska för råd, kontakta barnavårdscentralen (BVC) eller vårdcentral
- Läppen är tejpad med DuoDERM Ultra Thin, som vi skickar med vid hemgång. Tejpen ska bytas efter sex dagar (hemma eller på BVC). Läppen tvättas då försiktigt, lufttorkas och sedan sätts ny DuoDERM-tejp på. Detta upprepas vid behov i fyra veckor efter operationen

Uppföljning

Ni får en kallelse hemskickad till nästa operation eller ett återbesök för läkningskontroll efter 6–10 månader. I samband med utskrivning meddelar läkaren hur uppföljningen planeras.

Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.



1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se