



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Maligt melanom

Information



Denna information har utformats för dig som ska opereras på grund av maligt melanom. Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Plastikkirurgmottagningen (mån – fre, kl 7 – 9.30) 018-611 54 36

Avdelning 85F2 (akuta besvär, kvällar och helger) 018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Datum: 2019-05-31
ID: DocPlusSTYR196-1761

REGION UPPSALA

Malignt melanom

I Sverige finns ett nationellt vårdprogram för behandling av malignt melanom (www.cancercentrum.se > Cancerdiagnoser > Hud och ögon > Vårdprogram).

Vårdprogrammet erbjuder nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av alla patienter med malignt melanom, i olika skeden av sjukdomen.

Plastikkirurgmottagningen utför kirurgisk behandling av malignt melanom, i enlighet med de nationella riktlinjerna.

För mer information om malignt melanom kan du kolla på www.1177.se.

Operationen

- Beroende på melanomets tjocklek, tas melanomet bort med en viss marginal, 10 – 20 millimeter, enligt nationellt vårdprogram. Marginalen mäts från de yttersta kanterna eller från kvarstående operationsärr, runt hela melanomet.
- Vävnaden som tas bort skickas för mikroskopisk undersökning.
- Avslutningsvis sys såret ihop.

Ibland kan melanomets storlek och lokalisering göra det svårt att få ihop såret. Då kan det bli aktuellt med ett hudtransplantat. Det innebär att läkaren tar en liten bit hud, vanligen från närliggande område, varmed operationssåret täcks. Bedömningen om hudtransplantat sker före operation i samband med att du träffar läkaren.

Om man enligt vårdprogrammet ska undersöka den så kallade portvaktskörteln, bifogas information om detta med din operationskallelse.

Stygnborttagning

- Sker på vårdcentralen.
- Ibland syr läkaren med resorberbara stygn som försvinner av sig själv.

Sårläkning

En normal läkningsprocess innebär:

- Svag rodnad och klåda i sårkanterna
- Blåmärken som skiftar i färg
- Knölar runt ärret

Vid ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår, bör du kontakta plastikkirurgmottagningen.

För finare ärrbildning:

- Tejpa ärren med kirurgtejp i minst tre månader, finns att köpa på apotek.
- Smörj ärren med mjukgörande salva.
- Undvik att sola på ärren första året efter operation.

Vävnadsprov

Provsvar efter 10 – 12 dagar via brev, telefon eller mottagningsbesök.

Uppföljning

Uppföljning sker efter avslutad kirurgisk behandling på onkologmottagningen eller hudmottagningen. Besked om detta ges i samband med provsvar.

Observera att detta är generella rutiner och det kan ändras utifrån individuella behov.



1177 Vårdguiden

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se