



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Myomektomi

Information



Denna information har utformats för dig som ska genomgå operation för att minska medrörelser i underläppen eller den tunna, breda halsmuskeln.

Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Plastikkirurgmottagningen (vardagar 7 – 9.30) 018-611 54 36

Avdelning 85 F2 (akuta besvär, kvällar och helg) 018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Datum: 2020-05-13
ID: DocPlusSTYR196-2174

REGION UPPSALA

Övergripande om myomektomi

Vid ansiktsförflamning kan det hända att nervfunktionen till viss del inte kommer tillbaka.

Om det händer i nerver runt munnen kan leendet bli snett och asymmetriskt. I första hand behandlas det med botulinumtoxininjektioner men den effekten går ur efter ett tag. Är personen nöjd med effekten av botulinumtoxin kan en operation bli aktuell som ger en bestående effekt.

Platysma är en tunn, bred hudmuskel på halsen. Vi människor har just ingen användning för den halsmuskeln medan till exempel hästar använder muskeln till att skaka bort flugor. Efter ansiktsförflamning kan det bli resttillstånd i form av synkinesier, det vill säga medrörelser, som gör att muskeln ofrivilligt aktiveras och det blir en spänning som inte går att påverka. Spänningen kan variera i kraft och upplevas både besvärligt och obehagligt. I första hand behandlas det med botulinumtoxininjektioner men den effekten går ur efter ett tag. Är personen nöjd med effekten av botulinumtoxin kan en operation bli aktuell som ger en bestående effekt, platysmektomi.

Operationen

Själva operationen har samma effekt som botulinumtoxininjektioner men med bestående effekt. Det innebär att en del av muskeln skärs av men inte hela muskeln. Det är dock viktigt att veta att en operation aldrig kan ge samma resultat som före skadan men det kan bli en klar förbättring. Det blir ett ärr i området.

Operationen vid halsmuskel sker i narkos och tar ca 1 timme.

Operation i muskeln nedanför mungipan sker i lokalbedövning och tar ca 1 timme.

Efter operationen

- Du kommer ha en viss svullnad i området efter operationen. Den svullnaden håller i sig någon vecka och minskar gradvis.
- Du kan åka hem samma dag.

Sjukskrivning

Du blir sjukskriven en vecka efter operationen.

Sårläkning

En normal läkningsprocess innebär:

- Svag rodnad och klåda i sårkanterna
- Blåmärken som skiftar i färg
- Knölar runt äret

Vid ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår, bör du kontakta plastikkirurgmottagningen.

För finare ärrbildning

- Tejpa ärren med kirurgtejp i minst tre månader, finns att köpa på apotek
- Smörj ärren med mjukgörande salva
- Undvik att sola på ärren första året efter operation

Uppföljning

Återbesök till plastikkirurgmottagningen

- En vecka efter operation: sköterskebesök, tiden ges i samband med utskrivning. Besöket kan eventuellt ske på hemorten
- Tre månader efter operation: återbesök till läkare

Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.



1177 Vårdguiden

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se