



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Leendeförbättrande kirurgi, temporalismuskelöverföring

Information



Denna information har utformats för dig som ska genomgå leendeförbättrande kirurgi där temporalismuskeln flyttas. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Plastikkirurgmottagningen (vardagar 7 – 9.30) 018-611 54 36

Avdelning 85 F2 (akuta besvär, kvällar och helg) 018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Datum: 2020-06-30
ID: DocPlusSTYR196-2175

REGION UPPSALA

Nervfunktion vid ansiktsförlamning

Vid ansiktsförlamning kan det hända att nervfunktionen till viss del inte kommer tillbaka. Om nerven som styr leendet inte fungerar resulterar det i en hängande mungipa. Det kan vara svårt att äta, ansiktsuttryck kan vara asymmetriska och leendet snett.

Leendeförbättrande kirurgi

Genom att vrida muskeln vid tinningen ned över kinden och fästa vid mungipan kan leendefunktionen förbättras. Ibland flyttas en liten bit bindvävshinna, fascia från låret som sätts under huden i kinden och fäster upp mot tinningen för bättre symmetri i ansiktet. Det är dock viktigt att veta att en operation aldrig kan ge samma resultat som före skadan, men det kan bli en klar förbättring. Att ta en bit av fascia på låret ger ingen märkbar skillnad men det blir ett ärr i området där den tas ifrån. Operationen sker i narkos och tar cirka 2 timmar.

Vårdtiden beräknas till två dagar inklusive inskrivningsdagen.

Efter operationen

- Du kommer vara svullen i kinden efter operationen. Den svullnaden håller i sig dagar och kommer att minska gradvis.
- Ibland kan det behövas ytterligare en operation för att förbättra symmetrin.

Sjukskriven

Du blir sjukskriven 2 – 3 veckor efter operationen.

Sårläkning

En normal läkningsprocess innebär:

- Svag rodnad och klåda i sårkanterna
- Blåmärken som skiftar i färg
- Knölar runt äret

Vid **ökad** rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår, bör du kontakta plastikkirurgmottagningen.

För finare ärrbildning

- Tejpa ärren med kirurgtejp i minst tre månader, finns att köpa på apotek
- Smörj ärren med mjukgörande salva
- Undvik att sola på ärren första året efter operation

Uppföljning

Återbesök till plastikkirurgmottagningen

- En vecka efter operation: sköterskebesök, tiden ges i samband med utskrivning. Besöket kan eventuellt ske på hemorten
- Tre månader efter operation: återbesök till läkare och fysioterapeut

Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.



1177 Vårdguiden

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se