



AKADEMISKA  
SJUKHUSET

# Operation med guldviktsimplantat

Information



Denna information har utformats för dig som ska genomgå en operation där en liten, tunn vikt läggs i övre ögonlocket för att göra det möjligt att sluta ögonlocket.

Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



## Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på [www.1177.se](http://www.1177.se)

Plastikkirurgmottagningen (vardagar 7 – 9.30) 018-611 54 36

Avdelning 85 F2 (akuta besvär, kvällar och helg) 018-611 54 25



Vänd sida för  
att läsa mer!

Datum: 2020-05-14  
ID: DocPlusSTYR196-2177

REGION UPPSALA

## Att sluta ögat efter ansiktsförlamning

Efter ansiktsförlamning kan det hända att nervfunktionen inte kommer tillbaka som tidigare. Om det händer nerven som styr muskeln runt ögat, kan det bli svårt att stänga eller helt stänga ögat. Det kan leda till ögontrötthet, igenklistrat öga på morgonen, skav, sveda, klåda, brännande känsla, tråddragande sekret, ljuskänslighet, dimsyn och att det lättare blir ögoninflammation.

## Guldviktsimplantat

En liten, tunn vikt kan då läggas in i det övre ögonlocket så att det blir lättare att stänga ögat helt. Det sker oftast polikliniskt med lokalbedövning.

Operationen tar 1 timme.

## Före operationen

Du ska vara nikotinfri sex veckor före och sex veckor efter operation. Tobaksanvändning i samband med operation medför en ökad risk för komplikationer.

## Efter operationen

- Du får åka hem samma dag
- Ögondroppar tas under 1 månad efter operationen eller längre vid behov
- Du kommer ha en viss svullnad kring ögat efter operationen. Den svullnaden kan hålla i sig flera veckor och kommer att minska gradvis

## Sjukskrivning

Du blir sjukskriven en vecka efter operationen.

## Sårläkning

En normal läkningsprocess innebär:

- Svag rodnad och klåda i sårkanterna
- Blåmärken som skiftar i färg
- Knölar runt ärret

Vid ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår, bör du kontakta plastikkirurgmottagningen.

## För finare ärrbildning

Undvik att sola på ärren första året efter operation

## Uppföljning

Återbesök till plastikkirurgmottagningen

- En vecka efter operation: sköterskebesök, tiden ges i samband med utskrivning.  
Besöket kan eventuellt ske på hemorten
- Tre månader efter operation: återbesök till läkare

Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.



### 1177 Vårdguiden

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



### Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:  
[patientkontakt@akademiska.se](mailto:patientkontakt@akademiska.se)  
Patientkontakt 018-611 30 33,  
Växel: 018-611 00 00  
[www.akademiska.se](http://www.akademiska.se)