



AKADEMISKA
BARNSJUKHUSET

Hypospadi kort

Information



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster:
Dagsjukvårdsmottagningen för barn
och ungdom, måndag till fredag 8 – 16
Barnavdelning 95 B kvällar och helger

www.1177.se

018-611 58 23
018-611



Vänd sida för
att läsa mer!

Vad är hypospadi?

Hypospadi är en medfödd defekt som innebär att urinröret mynnar på undersidan av penis. Ofta är det ett överskott av förhud på ovansidan av penis och penis kan vara krokig (detta syns väl vid erektion). Hypospadi delas in i olika grupper beroende på var urinröret mynnar.


Olika typer

Kort hypospadi:

- Glandulär hypospadi: framme vid ollonet
- Penil hypospadi: främre skaftet av penis

Lång hypospadi:

- Penoskrotal hypospadi: i vinkeln mellan penis och pung
- Perineal hypospadi: mellan pung och ändtarmsmynning



Orsak

Orsaken till att barnet föddes med hypospadi är okänd, men en viss ärftlighet verkar föreligga.

Behandling

Operation av hypospadi syftar till att åstadkomma en så normal penis som möjligt, så att pojken ska kunna kissa på vanligt sätt och i framtiden ha ett fungerande sexualliv. Operationen utförs vanligen när barnet är ett till två år. Vid operation av kort hypospadi är vårdtiden en till två dagar och barnet vårdas på dagvårdsavdelningen med övernattnings på patienthotell.

Före operationen

Dagen innan operationen träffar ni sjuksköterska på dagsjukvårdsmottagningen. Vi går igenom förberedelser och vad som händer på operationsdagen. Om barnet inte har bajsat senaste 2 dygnen innan operationen behöver Klyx ges kvällen före operation. Klyx är ett laxerande medel som sprutas in i ändtarmen och hjälper till att tömma tarmen. Dosering enligt följande:

Klyx

Barn 1–5 mån:	20–40 ml
Barn 6–11 mån:	60 ml
Barn 1–5 år:	120 ml
Barn över 5 år:	120–240 ml

På operationsdagens morgon träffar ni barnurolog som ger information om hur operationen går till. Operationen utförs i narkos och tar cirka två timmar.

Operation

Vid operationen görs en urinrörplastik mellan ollon och förhud så att urinrörsmynningen läggs närmare sin rätta plats, samt att penis vid behov rätas upp. Detta görs med olika operationsmetoder, beroende på var urinröret mynnar. Vilken metod som skall användas, bestäms slutgiltigt vid operationstillfället.

Under operationen får barnet en kateter (slang) i urinröret till blåsan. Kateter ska sitta 3–7 dagar. Under operationen läggs även en sakralbedövning, en slags ryggbedövning, som bedövar det opererade området några timmar så att barnet är smärtlindrad.

Efter operationen

Efter operationen får ni vara tillsammans med pojken på uppvakningsavdelningen tills det är dags att komma tillbaka till avdelningen. Därefter är ni på dagvårdsavdelningen tills pojken mår bra och ni känner er trygga med att åka hem/till patienthotellet. Dagen efter operationen kommer ni tillbaka till dagvårdsavdelningen för avslutande kontroll innan utskrivning.

Bandage

Barnet kommer att ha en slang i urinröret (kateter). Kateter hålls oftast på plats med ett stygn och ett bandage. Förbandet består antingen av genomskinlig plast (Tegaderm) över penis eller ett litet större bandage. Urinen droppar hela tiden via slangen.

Vi använder oss av ”dubbelblöja”, fördelen med detta är att avföringen hamnar i den inre blöjan medan urinen droppar ut i den yttre. Man undviker på det sättet att katetern kommer i kontakt med avföring. Ni kommer få undervisning i hur man använder dubbelblöja när ni är på avdelningen. Om barnet inte använder blöjor kopplas katetern till en kateterpåse.

Smärtlindring

Barnet brukar få Alvedon och Ipren som smärtlindring första dagarna efter operationen. Om barnet dricker dåligt kan urinblåsan reagera på katetern, det kallas för blåskrämp. Detta är helt ofarligt men smärtsamt för barnet. Ge därför extra dryck under katetertiden. Eventuellt behöver ni ge kramplösande medicin (Stesolid – Diazepam), ni kommer få ta med en dos hem.



Hemma

Vid hemkomsten efter operationen ska ni tänka på följande:

- Alvedon/Ipren kan ges vid behov hemma i några dagar till.
- Barnet ska vara hemma från förskola/dagmamma tills katetern är borttagen.
- Barnet får tvättas av eller duscha, men INTE bada, varken i badkar eller i badhus.
- Barnet ska inte cykla, åka sparkbil osv. Undvik vilda lekar och liknande aktiviteter under katetertiden.
- Kontrollera alltid att det droppar urin ur slangen vid blöjbyte samt om barnet visar tecken på smärta. Vid stopp i katetern och läckage bredvid katetern kan ni spola den

enligt den instruktion ni får när ni är på sjukhuset. Om ni känner er osäkra– kontakta dagvårdsavdelningen.

- Uppsök närmaste barnmottagning för förbandsbyte om det kommer avföring eller urin under bandaget.

Återbesök

En vecka efter operationen får ni komma till dagsjukvårdsmottagningen alternativt ert hemskjulkhus för att ta bort katetern. Bokad tid för detta meddelas innan hemgång.

När pojken har kissat ordentligt efter borttagning av katetern och mår helt bra får ni åka hem. Barnet får inte bada på ytterligare en vecka efter katetern och förbandet är borttagna.

Hemma efter kateterborttagning

Vid hemkomsten tänk på följande:

- Något speciellt förband behövs inte efter kateterborttagningen.
- Alvedon/Ipren kan ges vid behov hemma i några dagar till.
- Barnet får tvättas av eller duscha, men INTE bada, varken i badkar eller i badhus.
- Barnet ska inte cykla, åka sparkbil, hoppa studsatta osv. i 2–3 veckor till.

VIKTIGT! Dra inte tillbaka förhuden på minst två månader!

Uppföljning

Återbesök sker efter tre månader på Urologmottagningen för barn och ungdom. Alternativt träffar ni barnurolog på hemorten i samband med konsultbesök.

För dig som är barn eller ungdom

Du som är barn eller ungdom har på samma sätt som vuxna rätt att få information som är lätt att förstå. På www.akademiska.se/ung kan du till exempel läsa om hur det går till vid våra vanligaste undersökningar.



1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se