



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Ryggmärgsstimulering (SCS) Test i två steg

Information



Har du frågor, kontakta:

Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se

Neuromodulationsmottagningen

018-611 11 10

Knappval 2



Vänd sida för
att läsa mer!

Övergripande om ryggmärgsstimulering (SCS) Test i två steg

Du kommer till oss för att testa ryggmärgsstimulering i två steg vilket innebär att du får två tider. Först en tid för inläggning av elektrod och efter 14 dagar ytterligare en tid då man bestämmer om du ska ha ett permanent system eller ej. Detta beror helt på hur du svarat på behandlingen.

Inför operation

- Du ska vara fastande, alltså inte äta fast föda från kl 24.00 natten innan operation.
- Du får dricka klara vätskor (ej mjölkprodukter, kaffe med mjölk, juice, saftsoppa) **2 timmar** innan ankomst till sjukhuset.
- Du får inte snusa, tugga tuggummi eller röka 6 timmar innan operationen. Du som har operationstid efter kl 12.00 får äta en lätt frukost före kl 6.00.
- Om du äter blodförtunnande läkemedel eller något av medicinerna som anges på bifogat blad, ta då kontakt med Neuromodulationsmottagningen via 1177.se.
- Du ska duscha med desinfektionsmedlet Descutan kvällen innan operationen och på operationsdagens morgon. Descutan köps på apoteket.
- Ta med dina egna smärtstillande läkemedel.
- Kontakta sjukresesektionen i din region om du behöver hjälp med resa och eventuellt boende i samband med ingreppet.

På operationsdagen

När du kommer till Samariterhemmet får du byta om till operationskläder. Efter det får du sitta ned i väntrummet. Väntetiden kan bli upp till några timmar, så ta med tidsfördriv. Operationen tar ca 90 minuter och görs i lokalbedövning. Du får smärtstillande och lugnande läkemedel.

Du ligger på mage på operationsbordet. Via en nål i ryggen placeras elektroden utanför ryggmärgskanalen i epiduralrummet. Elektroden fäst fast och kopplas till en förlängningssladd som går ut genom huden och kopplas till ett externt batteri som är fast tejp på ryggen i 14 dagar.

Efter operation

- Du får åka hem samma dag. Innan du åker hem får du information och instruktioner om fortsatt vård och behandling.
- Du ska äta penicillin i 14 dagar under hela testperioden. Som smärtlindring efter operationer kan du ta Paracetamol (Alvedon).
- Du ska inte köra bil själv hem efter ingreppet.



1177 Vårdguiden

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se