



AKADEMISKA
SJUKHUSET

Operation med neurektomi

Information



Denna information har utformats för dig som ska genomgå operation för att minska medrörelser i ansiktet.

Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.



Har du frågor, kontakta oss genom:

Logga in på www.1177.se

Plastikkirurgmottagningen (vardagar 7-9.30)

018-611 54 36

Avdelning 85 F2 (akuta besvär, kvällar och helg)

018-611 54 25



Vänd sida för
att läsa mer!

Övergripande om neurektomi

Vid ansiktsförflamning kan det hända att nervfunktionen till viss del inte kommer tillbaka. Efter ansiktsförflamning kan det bli resttillstånd i form av synkinesier, det vill säga medrörelser, som gör att muskeln ofrivilligt aktiveras och det blir en spänning som inte går att påverka. Spänningen kan variera i kraft och upplevas både besvärligt och obehagligt. I första hand behandlas medrörelser med botulinumtoxininjektioner men den effekten går ur efter ett tag. Är personen nöjd med effekten av botulinumtoxin kan en operation bli aktuell som ger en mer bestående effekt.

Operationen

Ett alternativ för ett mer långvarigt resultat är att dela vissa av ansiktsnervens nervgrenar som går till de muskler som rör sig ofrivilligt för att minska medrörelser och förbättra symmetri och leende. Tekniken kallas neurektomi och kombineras ibland med andra kirurgiska tekniker som myomektomi (man delar muskeln) och nervöverföring.

Själva operationen har samma effekt som botulinumtoxininjektioner men ger en mer bestående effekt. Det är dock viktigt att veta att en operation aldrig kan ge samma resultat som innan skadan men det kan bli en klar förbättring. Det kan finnas ett behov av botulinumtoxininjektioner även efter operationen men behovet brukar minska. Du får ett diskret ärr framför örat.

Operationen utförs i narkos och tar cirka 2,5 timmar.

Efter operationen

Du kommer ha en viss svullnad i området efter operationen. Den svullnaden håller i sig någon vecka och minskar gradvis.

Du åker hem samma dag eller dagen efter.

Sjukskrivning

Du blir sjukskriven i cirka 2 veckor.

Sårläkning

En normal läkningsprocess innebär:

- Svag rodnad och klåda i sårkanterna
- Blåmärken som skiftar i färg
- Knölar runt ärrret

Vid ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår, bör du kontakta plastikkirurgmottagningen.

För finare ärrbildning

- Tejpa ärrret med kirurgtejp i minst tre månader, finns att köpa på apotek
- Smörj ärrret med mjukgörande salva
- Undvik att sola på ärrret första året efter operation

Uppföljning

Återbesök till plastikkirurgmottagningen

- En vecka efter operation: sköterskebesök, tiden ges i samband med utskrivning. Besöket kan eventuellt ske på hemorten
- Tre månader efter operation: läkarbesök samt fysioterapeut.

Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.



1177

Du hittar information och tjänster för din hälsa och vård på webbplatsen 1177.se. För sjukvårdsrådgivning ring 1177, öppet dygnet runt.



Kontakt Akademiska

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se